

Numbers and Calculation 20 Question Learning Review

संख्याएँ और गणना 20 प्रश्नों का अध्ययन अभ्यास

Module review | Numbers and Calculation | Free bilingual workbook

मॉड्यूल अभ्यास | संख्याएँ और गणना | निःशुल्क द्विभाषी कार्यपुस्तिका

Use the English or Hindi section. Attempt the questions and show your steps before reading the explanations and checking the answers. This focused workbook is part of the five-lesson Numbers and Calculation module.

अंग्रेज़ी या हिंदी खंड चुनें। पहले प्रश्न हल करें और अपने चरण लिखें। उसके बाद व्याख्या पढ़ें और उत्तर जाँचें। यह केंद्रित कार्यपुस्तिका पाँच पाठों वाले संख्याएँ और गणना मॉड्यूल का हिस्सा है।

Choose your section / अपना खंड चुनें

[English review questions and explanations](#)

[English quick reference](#)

[हिंदी अभ्यास प्रश्न और व्याख्या](#)

[हिंदी त्वरित संदर्भ](#)

Original learning practice. Untimed, with no negative marking or pass cutoff. This workbook is not a full RRB CBT simulation or the complete Mathematics course.

मौलिक अध्ययन अभ्यास। समय-सीमा, ऋणात्मक अंकन या उत्तीर्ण होने की न्यूनतम अंक-शर्त नहीं है। यह कार्यपुस्तिका पूरे आरआरबी सीबीटी का अनुकरण या गणित का पूरा पाठ्यक्रम नहीं है।

Numbers and Calculation 20 Question Learning Review

Attempt this review after the five Numbers and Calculation lessons. Each question has exactly one correct answer and is worth one mark. This original learning review is untimed, with no negative marking and no pass cutoff. The four questions per lesson are a coverage choice, not a prediction of exam weighting. It is not a full RRB CBT simulation. Use natural numbers beginning at 1; factors, HCF and LCM refer to positive integers unless stated otherwise; $\sqrt{}$ denotes the nonnegative principal square root. Write a short reason or calculation before reading the key. Then revisit the relevant lesson and retry any missed question.

1

In this module, natural numbers begin at 1. Which statement about 0 is correct?

- A. It is natural but not an integer
 - B. It is a whole number, an integer and a rational number, but not natural
 - C. It is irrational because it has no sign
 - D. It is neither an integer nor rational
-

2

Evaluate $-10 - (6 - 9)$.

- A. -25
 - B. -13
 - C. -7
 - D. 7
-

3

Evaluate $48 \div 6 \times 2 + 5$.

- A. 21
 - B. 9
 - C. 13
 - D. 56
-

4

Evaluate $(-4)^2 + [18 - 6 \div 3]$.

- A. 0
 - B. 20
 - C. 60
 - D. 32
-

5

Which number is a factor of 72 but not a factor of 54?

- A. 12
 - B. 18
 - C. 9
 - D. 3
-

6

Which digit d makes the four-digit number $6d25$ divisible by 11?

- A. 1
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 7
-

7

Which is the prime factorisation of 630?

- A. $6 \times 3 \times 5 \times 7$
 - B. $2 \times 3 \times 5 \times 7$
 - C. $2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
 - D. $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
-

8

A positive integer is divisible by both 8 and 9. Which conclusion is justified?

- A. It must be divisible by 144
 - B. It cannot be divisible by 72
 - C. Its divisibility by 72 is uncertain
 - D. It must be divisible by 72 because 8 and 9 are co-prime
-

9

Two positive integers have HCF 8 and LCM 168. One is 24. What is the other?

- A. 48
 - B. 56
 - C. 64
 - D. 72
-

10

Find the LCM of 14, 21 and 30.

- A. 105
 - B. 180
 - C. 210
 - D. 420
-

11

72 red beads and 96 blue beads are put into the greatest possible number of identical packets, with no beads left over. How many packets are made?

- A. 24
 - B. 12
 - C. 36
 - D. 288
-

12

Three signals sound every 9, 12 and 20 seconds at fixed intervals, without skipping. They sound together now. After how many positive seconds will they next sound together?

- A. 60
 - B. 90
 - C. 120
 - D. 180
-

13

Evaluate $1\frac{2}{3} - \frac{5}{6}$.

- A. $\frac{1}{2}$
 - B. $\frac{5}{6}$
 - C. $\frac{7}{6}$
 - D. $\frac{4}{3}$
-

14

Evaluate $(\frac{3}{5}) \div (\frac{9}{10})$.

- A. $\frac{27}{50}$
 - B. $\frac{3}{2}$
 - C. $\frac{2}{3}$
 - D. $\frac{1}{6}$
-

15

Evaluate $0.45 \times 0.8 + 0.04$ exactly.

- A. 0.4
 - B. 0.076
 - C. 0.36
 - D. 0.76
-

16

The block 45 repeats forever in 0.454545.... Which fraction is exactly equal to this number?

- A. $\frac{9}{20}$
 - B. $\frac{45}{1000}$
 - C. $\frac{11}{5}$
 - D. $\frac{5}{11}$
-

17

What is $\sqrt{0.81}$?

- A. 0.09
 - B. -0.9
 - C. 0.9
 - D. Both 0.9 and -0.9
-

18

What is the smallest positive integer by which 450 must be multiplied to obtain a perfect-square integer?

- A. 2
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 10
-

19

In finding $\sqrt{6084}$ by long division, group the digits as 60 | 84. After choosing 7 as the first root digit, the remainder is 11; bringing down 84 gives 1184. Which product selects the next digit correctly?

- A. 148×78
 - B. 78×78
 - C. 14×8
 - D. 148×8
-

20

Between which consecutive integers does $\sqrt{200}$ lie?

- A. 12 and 13
 - B. 14 and 15
 - C. 15 and 16
 - D. 19 and 20
-

Explained answer key

1. **B.** The stated convention excludes 0 from natural numbers. Whole numbers include it; it is an integer and can be written $0/1$, so it is rational. Having no positive/negative sign does not make it irrational.
2. **C.** First $6 - 9 = -3$. Then $-10 - (-3) = -10 + 3 = -7$. The outside subtraction adds the opposite of the entire inner value.
3. **A.** $48 \div 6 \times 2 + 5 = 8 \times 2 + 5 = 16 + 5 = 21$. Division and multiplication have equal precedence. The distractor 9 comes from incorrectly grouping 6×2 as the divisor.
4. **D.** $(-4)^2 = 16$. Inside the brackets, divide before subtracting: $18 - 2 = 16$. The total is $16 + 16 = 32$. Treating the parenthesised base as -4^2 would give the incorrect option 0.
5. **A.** $72 = 12 \times 6$, while $54 = 12 \times 4 + 6$, so 12 satisfies both conditions. The other three numbers divide both 72 and 54.
6. **B.** The alternating difference is $(6 + 2) - (d + 5) = 3 - d$. For digits 0 through 9, it ranges from 3 to -6, so it must equal 0. Thus $d = 3$; $6325 = 11 \times 575$.
7. **C.** $630 = 63 \times 10 = 3^2 \times 7 \times 2 \times 5$. A has the correct product but leaves a composite factor 6, so it is not a completed prime factorisation. B and D give 210 and 1260.
8. **D.** $8 = 2^3$ and $9 = 3^2$ have no common prime factor. Both requirements together imply divisibility by $2^3 \times 3^2 = 72$. They do not guarantee 144; 72 itself is a counterexample.
9. **B.** For two positive integers, their product equals $\text{HCF} \times \text{LCM}$. The other number is $(8 \times 168) \div 24 = 56$. Verify: $\text{HCF}(24, 56) = 8$ and $\text{LCM}(24, 56) = 168$.
10. **C.** $14 = 2 \times 7$; $21 = 3 \times 7$; $30 = 2 \times 3 \times 5$. Taking each needed prime at its greatest required exponent gives $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$. It is divisible by all three.
11. **A.** The packet count must divide both totals, so take $\text{HCF}(72, 96) = 24$. Each packet has 3 red and 4 blue beads. The LCM 288 describes a common multiple, not the possible packet count.
12. **D.** Use the least positive common multiple: $9 = 3^2$, $12 = 2^2 \times 3$, $20 = 2^2 \times 5$. $\text{LCM} = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ seconds. This is 20, 15 and 9 full intervals, respectively; time 0 is the present coincidence.
13. **B.** $1\frac{2}{3} = 5/3 = 10/6$. Therefore $10/6 - 5/6 = 5/6$. A mixed numeral means the whole number plus the fraction, not multiplication.
14. **C.** Multiply by the reciprocal of the divisor: $(3/5) \times (10/9) = 30/45 = 2/3$. Check: $(2/3) \times (9/10) = 3/5$. Invert the divisor, not the dividend.
15. **A.** First $0.45 \times 0.8 = 0.36$; then $0.36 + 0.04 = 0.40 = 0.4$. Multiplication precedes addition and the trailing zero does not change the value. No rounding is involved.
16. **D.** Let $x = 0.454545\dots$. Then $100x = 45.454545\dots$. Subtracting gives $99x = 45$, so $x = 45/99 = 5/11$. The finite decimal 0.45 equals $9/20$ and is a different number.
17. **C.** $0.9^2 = 0.81$. The radical symbol selects the nonnegative principal root, so $\sqrt{0.81} = 0.9$. Both signs solve $x^2 = 0.81$, but that is a different question.

18. **A.** $450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$. Only the factor 2 is unpaired, so multiply by 2. The result is $900 = 30^2$. No smaller positive integer than 2 except 1 is available, and 450 is not already a square.

19. **D.** Double the root prefix 7 and shift one place: $20 \times 7 = 140$. For next digit 8, $(140 + 8) \times 8 = 148 \times 8 = 1184$. The new root is 78. The trial divisor multiplies the next single digit, not the whole new root.

20. **B.** $14^2 = 196 < 200 < 225 = 15^2$, so $14 < \sqrt{200} < 15$. These are bounds; they do not say that the exact root is 14.5.

Quick reference

Revision checklist

- Use the stated natural-number convention. Distinguish a number's sign from the subtraction operation
- Evaluate innermost groups and powers first. Then perform multiplication/division from left to right, followed by addition/subtraction from left to right. Division by zero is undefined
- A factor divides exactly. Prime and co-prime mean different things; 1 is neither prime nor composite. The product-divisibility guarantee requires co-prime divisors
- Choose HCF for a greatest shared divisor and LCM for a least positive common multiple. State the quantity and conditions in a grouping or repeating-event problem
- Use equivalent common-sized parts for fraction addition. In division invert the nonzero divisor. Written finite-place decimal methods use terminating decimals; recurring decimals can be handled as exact fractions
- The radical $\sqrt{}$ selects the nonnegative principal root. In root long division, multiply the trial divisor by the next single digit. A permitted last digit does not prove a perfect square; bounds are not an exact midpoint

Use the explained key to identify the missed method and return to its numbered lesson. There is no pass cutoff.

संख्याएँ और गणना 20 प्रश्नों का अध्ययन अभ्यास

संख्याएँ और गणना के पाँचों पाठ पढ़ने के बाद यह अभ्यास करें। हर प्रश्न का ठीक एक सही उत्तर है और प्रत्येक एक अंक का है। यह मौलिक अध्ययन अभ्यास बिना समय-सीमा, ऋणात्मक अंकन और उत्तीर्ण सीमा के है। हर पाठ से चार प्रश्न विषयों को जाँचने का चुनाव है, परीक्षा के भारांक का अनुमान नहीं। यह पूरे RRB सीबीटी का अनुकरण नहीं है। प्राकृत संख्याएँ 1 से शुरू मानें; अलग से न कहा गया हो तो गुणनखंड, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य धनात्मक पूर्णाकों के लिए हैं; $\sqrt{\quad}$ अक्रणात्मक मुख्य वर्गमूल दर्शाता है। उत्तरमाला से पहले छोटा कारण या गणना लिखें। फिर संबंधित पाठ दोहराकर छूटा प्रश्न दोबारा हल करें।

1

इस मॉड्यूल में प्राकृत संख्याएँ 1 से शुरू हैं। 0 के बारे में कौन-सा कथन सही है?

- A. यह प्राकृत है, लेकिन पूर्णांक नहीं
- B. यह पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय है, लेकिन प्राकृत नहीं
- C. इसका चिह्न नहीं है, इसलिए यह अपरिमेय है
- D. यह न पूर्णांक है, न परिमेय

2

$-10 - (6 - 9)$ का मान निकालिए।

- A. -25
- B. -13
- C. -7
- D. 7

3

$48 \div 6 \times 2 + 5$ का मान निकालिए।

- A. 21
- B. 9
- C. 13
- D. 56

4

$(-4)^2 + [18 - 6 \div 3]$ का मान निकालिए।

- A. 0
- B. 20
- C. 60
- D. 32

5

कौन-सी संख्या 72 का गुणनखंड है, लेकिन 54 का नहीं?

- A. 12
 - B. 18
 - C. 9
 - D. 3
-

6

कौन-सा अंक d, चार अंकों की संख्या 6d25 को 11 से विभाज्य बनाता है?

- A. 1
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 7
-

7

630 का अभाज्य गुणनखंडन कौन-सा है?

- A. $6 \times 3 \times 5 \times 7$
 - B. $2 \times 3 \times 5 \times 7$
 - C. $2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
 - D. $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$
-

8

एक धनात्मक पूर्णांक 8 और 9 दोनों से विभाज्य है। कौन-सा निष्कर्ष सही है?

- A. वह 144 से अवश्य विभाज्य है
 - B. वह 72 से विभाज्य नहीं हो सकता
 - C. 72 से उसकी विभाज्यता अनिश्चित है
 - D. वह 72 से अवश्य विभाज्य है, क्योंकि 8 और 9 सह-अभाज्य हैं
-

9

दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक 8 और लघुत्तम समापवर्त्य 168 है। एक संख्या 24 है। दूसरी क्या है?

- A. 48
 - B. 56
 - C. 64
 - D. 72
-

10

14, 21 और 30 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए।

- A. 105
 - B. 180
 - C. 210
 - D. 420
-

11

72 लाल और 96 नीले मनकों से, बिना कुछ बचाए, अधिकतम कितने एक जैसे पैकेट बनाए जा सकते हैं?

- A. 24
 - B. 12
 - C. 36
 - D. 288
-

12

तीन संकेत निश्चित अंतरालों पर हर 9, 12 और 20 सेकंड में बजते हैं; कोई निर्धारित संकेत छूटता नहीं है। अभी तीनों साथ बजे हैं। अगली बार कितने सेकंड बाद साथ बजेंगे?

- A. 60
 - B. 90
 - C. 120
 - D. 180
-

13

$1\frac{2}{3} - \frac{5}{6}$ का मान निकालिए।

- A. $\frac{1}{2}$
 - B. $\frac{5}{6}$
 - C. $\frac{7}{6}$
 - D. $\frac{4}{3}$
-

14

$(\frac{3}{5}) \div (\frac{9}{10})$ का मान निकालिए।

- A. $\frac{27}{50}$
 - B. $\frac{3}{2}$
 - C. $\frac{2}{3}$
 - D. $\frac{1}{6}$
-

15

$0.45 \times 0.8 + 0.04$ का सटीक मान निकालिए।

- A. 0.4
 - B. 0.076
 - C. 0.36
 - D. 0.76
-

16

0.454545... में 45 का खंड अनंत बार दोहरता है। कौन-सी भिन्न इसके ठीक बराबर है?

- A. $\frac{9}{20}$
 - B. $\frac{45}{1000}$
 - C. $\frac{11}{5}$
 - D. $\frac{5}{11}$
-

17

$\sqrt{0.81}$ का मान क्या है?

- A. 0.09
 - B. -0.9
 - C. 0.9
 - D. 0.9 और -0.9 दोनों
-

18

450 को पूर्ण वर्ग पूर्णांक बनाने के लिए किस सबसे छोटे धनात्मक पूर्णांक से गुणा करना होगा?

- A. 2
 - B. 3
 - C. 5
 - D. 10
-

19

दीर्घ भाग विधि से $\sqrt{6084}$ निकालते समय अंक-समूह 60 | 84 हैं। पहला मूल-अंक 7 लेने पर शेषफल 11 है; 84 उतारने पर 1184 मिलता है। अगला अंक चुनने के लिए कौन-सा गुणन सही है?

- A. 148×78
 - B. 78×78
 - C. 14×8
 - D. 148×8
-

20

$\sqrt{200}$ किन दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच है?

- A. 12 और 13
 - B. 14 और 15
 - C. 15 और 16
 - D. 19 और 20
-

व्याख्या सहित उत्तरमाला

1. **B.** दी गई परिभाषा में 0 प्राकृत नहीं है। पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों में यह शामिल है तथा 0/1 लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय है। धन या ऋण चिह्न न होने से कोई संख्या अपरिमेय नहीं होती।
2. **C.** पहले $6 - 9 = -3$ । फिर $-10 - (-3) = -10 + 3 = -7$ । बाहर का घटाव पूरे अंदरूनी मान की विपरीत संख्या जोड़ता है।
3. **A.** $48 \div 6 \times 2 + 5 = 8 \times 2 + 5 = 16 + 5 = 21$ । भाग और गुणा की प्राथमिकता समान है। 6×2 को गलत तरीके से एक साथ भाजक मानने पर विकल्प 9 मिलता है।
4. **D.** $(-4)^2 = 16$ । कोष्ठक के अंदर घटाव से पहले भाग करें: $18 - 2 = 16$ । कुल $16 + 16 = 32$ है। कोष्ठक वाले आधार को गलत ढंग से -4^2 मानने पर विकल्प 0 मिलेगा।
5. **A.** $72 = 12 \times 6$, जबकि $54 = 12 \times 4 + 6$, इसलिए 12 दोनों शर्तें पूरी करता है। बाकी तीन संख्याएँ 72 और 54 दोनों को निःशेष भाग देती हैं।
6. **B.** एकांतर योगों का अंतर $(6 + 2) - (d + 5) = 3 - d$ है। 0 से 9 तक के अंकों के लिए यह 3 से -6 तक है, इसलिए इसे 0 होना चाहिए। अतः $d = 3$; $6325 = 11 \times 575$ ।
7. **C.** $630 = 63 \times 10 = 3^2 \times 7 \times 2 \times 5$ । A का गुणनफल सही है, लेकिन भाज्य गुणनखंड 6 बचा है, इसलिए वह पूरा अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। B और D से 210 और 1260 मिलते हैं।
8. **D.** $8 = 2^3$ और $9 = 3^2$ में कोई साझा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। दोनों शर्तों से $2^3 \times 3^2 = 72$ की विभाज्यता निश्चित है। 144 की नहीं; स्वयं 72 इसका प्रतिउदाहरण है।
9. **B.** दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल महत्तम समापवर्तक $\times$ लघुत्तम समापवर्त्य के बराबर है। दूसरी संख्या $(8 \times 168) \div 24 = 56$ है। जाँच: 24 और 56 का महत्तम समापवर्तक 8 तथा लघुत्तम समापवर्त्य 168 है।
10. **C.** $14 = 2 \times 7$; $21 = 3 \times 7$; $30 = 2 \times 3 \times 5$ । हर आवश्यक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी अपेक्षित घात लेने पर $2 \times 3 \times 5 \times 7 = 210$ मिलता है। यह तीनों से विभाज्य है।
11. **A.** पैकेटों की संख्या दोनों कुल संख्याओं को निःशेष भाग दे, इसलिए 72 और 96 का महत्तम समापवर्तक 24 लें। हर पैकेट में 3 लाल और 4 नीले मनके होंगे। लघुत्तम समापवर्त्य 288 साझा गुणज है, संभव पैकेटों की संख्या नहीं।
12. **D.** सबसे छोटा धनात्मक साझा गुणज लें: $9 = 3^2$, $12 = 2^2 \times 3$, $20 = 2^2 \times 5$ । लघुत्तम समापवर्त्य $= 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$ सेकंड। इसमें क्रमशः 20, 15 और 9 पूरे अंतराल हैं; समय 0 अभी का साथ बजना है।
13. **B.** $1\frac{1}{3} = 5/3 = 10/6$ । इसलिए $10/6 - 5/6 = 5/6$ । मिश्र भिन्न का अर्थ पूर्णांक और भिन्न का योग है, गुणा नहीं।
14. **C.** भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करें: $(3/5) \times (10/9) = 30/45 = 2/3$ । जाँच: $(2/3) \times (9/10) = 3/5$ । भाजक उलटें, भाज्य नहीं।
15. **A.** पहले $0.45 \times 0.8 = 0.36$; फिर $0.36 + 0.04 = 0.40 = 0.4$ । जोड़ से पहले गुणा होता है और अंत का शून्य मान नहीं बदलता। यहाँ सन्निकटन नहीं किया गया है।
16. **D.** $x = 0.454545...$ लें। तब $100x = 45.454545...$ । घटाने पर $99x = 45$, इसलिए $x = 45/99 = 5/11$ । सीमित दशमलव 0.45 का मान $9/20$ है और वह अलग संख्या है।
17. **C.** $0.9^2 = 0.81$ । मूल चिह्न अऋणात्मक मुख्य वर्गमूल दर्शाता है, इसलिए $\sqrt{0.81} = 0.9$ । $x^2 = 0.81$ के हल दोनों चिह्नों वाले हैं, लेकिन वह अलग प्रश्न है।
18. **A.** $450 = 2 \times 3^2 \times 5^2$ । केवल 2 का जोड़ा अधूरा है, इसलिए 2 से गुणा करें। परिणाम $900 = 30^2$ है। 2 से छोटा धनात्मक पूर्णांक केवल 1 है और 450 पहले से वर्ग नहीं है।

19. **D.** मूल के अब तक के भाग 7 को दुगुना करके एक स्थान बढ़ाएँ: $20 \times 7 = 140$ । अगले अंक 8 के लिए $(140 + 8) \times 8 = 148 \times 8 = 1184$ । नया मूल 78 है। परीक्षण भाजक को अगले एक अंक से गुणा करते हैं, पूरे नए मूल से नहीं।

20. **B.** $14^2 = 196 < 200 < 225 = 15^2$, इसलिए $14 < \sqrt{200} < 15$ । ये सीमाएँ हैं; इससे सटीक मूल 14.5 नहीं हो जाता।

त्वरित संदर्भ

पुनरावृत्ति की जाँच-सूची

- प्राकृत संख्याओं की बताई हुई परिभाषा अपनाएँ। संख्या के चिह्न और घटाने की संक्रिया में अंतर रखें
- पहले सबसे अंदर के कोष्ठक और घात हल करें। फिर गुणा/भाग बाएँ से दाएँ और उसके बाद जोड़/घटाव बाएँ से दाएँ करें। शून्य से भाग अपरिभाषित है
- गुणनखंड निःशेष भाग देता है। अभाज्य और सह-अभाज्य अलग बातें हैं; 1 न अभाज्य है, न भाज्य। गुणनफल से विभाज्यता की गारंटी के लिए भाजक सह-अभाज्य होने चाहिए
- सबसे बड़े साझा भाजक के लिए महत्तम समापवर्तक और सबसे छोटे धनात्मक साझा गुणज के लिए लघुत्तम समापवर्त्य चुनें। समूह या दोहराव के प्रश्न में पूछी गई मात्रा और शर्तें स्पष्ट रखें
- भिन्नों के जोड़ में समान आकार के समतुल्य हिस्से लें। भाग में अशून्य भाजक का व्युत्क्रम लें। लिखित सीमित-दशमलव-स्थान विधियाँ सांत दशमलवों के लिए हैं; आवर्ती दशमलवों को सटीक भिन्न में बदलकर गणना कर सकते हैं
- $\sqrt{\quad}$ चिह्न अक्रणात्मक मुख्य वर्गमूल चुनता है। वर्गमूल की दीर्घ भाग विधि में परीक्षण भाजक को अगले एक अंक से गुणा करें। स्वीकार्य अंतिम अंक पूर्ण वर्ग होने का प्रमाण नहीं है; सीमाएँ सटीक मध्यबिंदु नहीं बतातीं

व्याख्या सहित उत्तरमाला से छूटी विधि पहचानें और उसके पाठ पर लौटें। कोई उत्तीर्ण सीमा नहीं है।